

试卷代号:11474

座位号

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

临床医学概论(本) 试题

2024年7月

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题2分,共50分)

1. 引起发热的病因甚多,临床上最常见的病因是()。
 - A. 组织坏死与细胞破坏性疾病
 - B. 感染性病因
 - C. 皮肤散热减少
 - D. 体温调节中枢功能失常性疾病
 - E. 心脏、肺、脾等内脏梗死或肢体坏死
2. 与咳嗽、咳痰相关的疾病中,最常见的疾病是()。
 - A. 消化系统疾病
 - B. 心血管疾病
 - C. 中枢神经系统疾病
 - D. 呼吸道疾病
 - E. 胸膜疾病
3. 男性,35岁,经常上腹部不适10年,近两月来,呕吐频繁。体格检查:上腹部见蠕动波,振水声阳性,其呕吐物的性状应是()。
 - A. 带粪臭味
 - B. 黄绿色液体
 - C. 咖啡样液体
 - D. 鲜血
 - E. 酸酵食物
4. 血红蛋白的正常参考值为()。
 - A. 男性80~160g/L,女性70~150g/L
 - B. 男性90~150g/L,女性80~140g/L
 - C. 男性110~150g/L,女性120~140g/L
 - D. 男性120~165g/L,女性110~150g/L
 - E. 男性130~170g/L,女性100~150g/L

5. 尿酮体增高最多见于()。
 - A. 肝硬化
 - B. 糖尿病
 - C. 伤寒
 - D. 甲状腺功能亢进
 - E. 贫血
6. 临床判断消化道出血完全停止的最可靠的实验指标结果是()。
 - A. 粪镜检无红细胞
 - B. 无柏油样黑便
 - C. 粪胆素试验阴性
 - D. 粪隐血试验阴性
 - E. 粪胆原试验阴性
7. 急性上呼吸道感染最主要的治疗措施是()。
 - A. 中药治疗
 - B. 止咳化痰
 - C. 抗菌药物治疗
 - D. 抗病毒治疗
 - E. 对症治疗
8. 支原体肺炎的临床表现特点为()。
 - A. 发病前常有受凉等诱因
 - B. 起病缓慢,咳嗽多为阵发性刺激性呛咳,咳少量黏液
 - C. 发病急
 - D. 高热,体温多高达39~40℃
 - E. 肺实变体征明显
9. COPD的病因不清,与多种因素有关,下列选项中最为重要的因素是()。
 - A. 空气污染
 - B. 感染
 - C. 气温的突变
 - D. 吸烟
 - E. 蛋白酶-抗蛋白酶失衡
10. 支气管哮喘的共同病理生理特征是()。
 - A. 变态反应
 - B. 迷走神经亢进
 - C. 气道炎症
 - D. 气道高反应性
 - E. β 肾上腺素受体功能低下
11. 心肺复苏初期,血压维持较佳的水平是()。
 - A. 收缩压90mmHg
 - B. 平均动脉压80mmHg
 - C. 舒张压65mmHg
 - D. 140/85mmHg
 - E. 舒张压90mmHg
12. 关于急性冠状动脉综合征的并发症,发生率最高的是()。
 - A. 室间隔穿孔
 - B. 心室游离壁破裂
 - C. 心室壁瘤
 - D. 乳头肌功能失调或断裂
 - E. 栓塞
13. 诊断慢性胃炎最可靠的依据是()。
 - A. 慢性上腹部疼痛
 - B. 胃镜检查及胃黏膜活检
 - C. 胃酸降低
 - D. X线钡餐检查
 - E. 胃脱落细胞检查

○-○-○

考点名称:

姓名:

学号:

○-○-○

14. 关于急性胰腺炎的临床表现,下列表述错误的是()。
- A. 常有腹胀和肠鸣音减弱 B. 腹痛向腰背部放射
C. 腹部体征与腹痛轻重相平行 D. 腹部可有深压痛
E. 屈曲体位可减轻腹痛
15. 胃溃疡的好发部位是()。
- A. 胃底 B. 胃体
C. 胃小弯 D. 胃大弯
E. 幽门管
16. 少尿是指()。
- A. 尿量<100mL/天 B. 尿量<400mL/天
C. 尿量<400mL/h D. 尿量<1000mL/天
E. 尿量<1400mL/h
17. 下列不是肾病综合征的主要临床表现的是()。
- A. 高磷血症 B. 高脂血症
C. 水肿 D. 尿蛋白大于 3.5g/d
E. 低蛋白血症
18. 在我国,慢性肾衰最常见的病因为()。
- A. 高血压 B. 糖尿病肾病
C. 原发性肾小球肾炎 D. 肾小动脉硬化
E. 慢性肾盂肾炎
19. 急性肾小球肾炎在治疗上不宜使用()。
- A. 利尿剂 B. 低盐饮食
C. 糖皮质激素 D. 降血压治疗
E. 抗生素
20. 再生障碍性贫血与急性白血病的主要区别为()。
- A. 全血细胞减少 B. 骨髓象特点
C. 有无肝脾肿大 D. 网织红细胞缺乏
E. 外周血中有无幼稚细胞
21. 对血液病患者最应警惕发生的情况是()。
- A. 皮肤、黏膜血肿 B. 呼吸道出血
C. 颅内出血 D. 消化道出血
E. 泌尿生殖道出血

22. 关于胰岛素的描述错误的是()。
- A. 多采用口服给药方式
B. 可分为短效、中效、长效等类型
C. 是最有效的降糖药物
D. 皮下注射吸收快
E. 人源性胰岛素要好于动物源性胰岛素
23. 甲硫氧嘧啶最严重的不良反应是()。
- A. 过敏反应 B. 消化道反应
C. 甲状腺功能低下 D. 粒细胞缺乏
E. 黄疸性肝炎
24. 一侧面部和肢体运动障碍称为()。
- A. 单瘫 B. 偏瘫
C. 交叉性瘫痪 D. 截瘫
E. 局限性瘫痪
25. 防止脑出血患者出血加重的关键措施是()。
- A. 控制脑水肿 B. 防治并发症
C. 控制血压 D. 止血和凝血
E. 维持生命机能

二、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

26. 意识障碍
27. 慢性阻塞性肺疾病
28. 脑血栓形成
29. 再生障碍性贫血
30. 心力衰竭

三、简答题(每题 10 分,共 30 分)

31. 简述肺结核的治疗原则。
32. 简述肝硬化的病因。
33. 简述尿路感染治疗中抗感染治疗的用药原则。

试卷代号:11474

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

临床医学概论(本) 试题答案及评分标准

(供参考)

2024年7月

一、单项选择题(每题2分,共50分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. E | 4. D | 5. B |
| 6. D | 7. E | 8. B | 9. E | 10. D |
| 11. A | 12. D | 13. B | 14. C | 15. C |
| 16. B | 17. A | 18. C | 19. C | 20. B |
| 21. C | 22. A | 23. D | 24. B | 25. C |

二、名词解释(每题4分,共20分)

26. 意识障碍

意识障碍是指人对周围环境及自身状态的识别和觉察能力出现障碍。意识障碍多由高级中枢功能活动(意识、感觉和运动)受损所引起,可表现为嗜睡、意识模糊和昏睡,严重的意识障碍为昏迷。

27. 慢性阻塞性肺疾病

慢性阻塞性肺疾病是一种可预防和治疗的常见疾病,是以气流受限为特征的肺部疾病,气流受限不完全可逆,呈进行性发展。

28. 脑血栓形成

脑血栓形成是脑卒中最常见的类型,是脑动脉主干或皮质支动脉粥样硬化导致血管增厚、管腔狭窄闭塞和血栓形成,引起脑局部血流减少或供血中断,脑组织缺血、缺氧、坏死,出现局灶性神经系统症状和体征。

29. 再生障碍性贫血

再生障碍性贫血是由多种原因引起的骨髓造血功能衰竭,导致外周血中全血细胞减少的一种贫血性疾病。临床主要表现为全血细胞减少、贫血、出血和感染。

30. 心力衰竭

心力衰竭是指心脏疾病发展至一定阶段,心功能失代偿,使心输出量减少,全心衰竭时导致体循环灌注不足而肺循环淤血的一系列临床综合征。

(11474号)临床医学概论(本)答案第1页(共2页)

三、简答题(每题10分,共30分)

31. 简述肺结核的治疗原则。

答:肺结核的治疗原则是“早期、联合、适量、规律和全程用药”。早期是指对确诊的肺结核患者及早用药,以利于杀灭结核菌株(2分);联合是指根据病情及抗结核药的作用特点,联合两种以上药物,以增强与确保疗效(2分);适量是指掌握发挥药物最大疗效而又产生最小副作用的剂量,并根据病情和个体的不同,给予适量的药物剂量(2分);规律是指在强化和巩固阶段每日1次用药或每周2~3次间歇用药,不随意更改方案或随意停药(2分);全程用药是指完成抗结核杆菌的全程,满足连续用药的时间,短程化疗时间通常为6~9个月(2分)。

32. 简述肝硬化的病因。

答:(1)病毒性肝炎(1分);(2)慢性酒精中毒(1分);(3)胆汁淤积(1分);(4)循环障碍(1分);(5)药物或毒物(1分);(6)免疫疾病(1分);(7)寄生虫病(1分);(8)遗传和代谢疾病(1分);(9)营养不良(1分);(10)原因不明(1分)。

33. 简述尿路感染治疗中抗感染治疗的用药原则。

答:(1)选用致病菌敏感的抗生素。无病原学结果前,一般首选对革兰阴性杆菌有效的抗生素,尤其是首发尿路感染。(2分)

(2)抗生素在尿和肾内的浓度要高。(2分)

(3)选用肾毒性小、副作用少的抗生素。(2分)

(4)单一药物治疗失败、严重感染、混合感染、耐药菌株出现时应联合用药。(2分)

(5)对不同类型的尿路感染给予不同治疗时间。(2分)

(11474号)临床医学概论(本)答案第2页(共2页)