

试卷代号:11475

座位号

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

药物治疗学(本) 试题

2024年7月

学 号: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

考点名称: \_\_\_\_\_

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题2分,共80分)

1. 合理用药的基本原则不包括( )。  
A. 安全  
B. 有效  
C. 经济  
D. 质量合格
2. 属于间接成本的是指患者( )。  
A. 求诊支出的食宿费  
B. 伤残造成的误工损失  
C. 治疗引起的精神痛苦  
D. 药品费用
3. 成年男性贫血的诊断标准是( )。  
A. 血红蛋白 $<110\text{g/L}$   
B. 血红蛋白 $<120\text{g/L}$   
C. 血细胞比容 $<0.35$   
D. 红细胞计数 $<3.5\times 10^{12}/\text{L}$
4. 不属于肝功能检查的指标是( )。  
A. 谷丙转氨酶  
B. 白蛋白  
C. 总胆红素  
D. 血清肌酐
5. 反映糖尿病较长时间血糖控制水平的“金指标”是( )。  
A. 空腹血糖  
B. 餐后2小时血糖  
C. 尿糖  
D. 糖化血红蛋白
6. 关于肾上腺素受体阻滞剂的叙述,正确的是( )。  
A.  $\alpha$ 受体阻滞剂的代表药物有哌唑嗪、特拉唑嗪、美托洛尔等  
B.  $\alpha_1$ 受体阻滞剂单独应用于血压控制效果较好  
C. 禁用于妊娠妇女、高钾血症  
D.  $\beta$ 受体阻滞剂尤其适用于心率较快的中青年患者或合并心绞痛患者
7. LDL是指( )。  
A. 乳糜微粒  
B. 高密度脂蛋白  
C. 低密度脂蛋白  
D. 极低密度脂蛋白
8. 关于抗心律失常药物用于房颤,不正确的是( )。  
A. 可减轻房颤的相关症状  
B. 维持窦性心律的疗效为中等程度  
C. 如果一种抗心律失常药物治疗“无效”,可考虑换用其他抗心律失常药物  
D. 选择抗心律失常药物时,优先考虑有效性

9. 不属于心衰治疗基本药物的是( )。
- A.  $\beta$ 受体阻滞剂                      B. 呋塞米  
C. 维拉帕米                              D. 依那普利
10. 洋地黄类药物的禁忌证不包括( )。
- A. 病态窦房结综合征  
B. 预激综合征伴房颤或心房扑动  
C. 梗阻性肥厚型心肌病  
D. 心动过速
11. 肺结核初治的疗程为( )。
- A. 强化期 2 个月/巩固期 4 个月                      B. 强化期 3 个月/巩固期 5 个月  
C. 强化期 3 个月/巩固期 8 个月                      D. 强化期 4 个月/巩固期 2 个月
12. 治疗 COPD 的支气管扩张剂不包括( )。
- A.  $\beta_2$ 受体激动剂                      B. 抗胆碱能药物  
C. 茶碱类药物                              D. 糖皮质激素
13. 不属于双重抗血小板治疗首选指征的是( )。
- A. 轻型缺血性脑卒中患者  
B. 脑卒中发病 30d 内伴有症状性颅内动脉严重狭窄  
C. 急性非心源性 TIA  
D. 心源性栓塞导致的脑卒中
14. 抗癫痫药对于肝药酶代谢有自身诱导作用的是( )。
- A. 丙戊酸                                      B. 卡马西平  
C. 左乙拉西坦                              D. 托吡酯
15. 抗帕金森病药物中单用无效的是( )。
- A. 左旋多巴                                      B. 卡比多巴  
C. 金刚烷胺                                      D. 溴隐亭
16. 阿尔茨海默症患者的首发症状是( )。
- A. 记忆障碍                                      B. 时间、空间定向障碍  
C. 理解力和判断力障碍                      D. 睡眠障碍
17. 属于短效 BZDs 类的药物是( )。
- A. 咪达唑仑                                      B. 地西洋  
C. 氟西洋    D. 氯硝西洋

18. 通过选择性阻滞突触间隙 5-HT 再摄取而发挥抗抑郁作用的药物是( )。
- A. 阿米替林                                      B. 吗氯贝胺  
C. 帕罗西汀                                      D. 马普替林
19. 精神分裂症药物治疗原则的叙述,不正确的是( )。
- A. 一旦确定诊断,尽早开始抗精神病药物治疗  
B. 复发患者应换用之前未使用过的药物  
C. 药物不良反应可加重精神症状,应重视  
D. 应尽可能单一用药
20. 失眠的药物治疗原则,不正确的是( )。
- A. 对于一过性或急性失眠者,不应使用药物治疗,以免形成药物依赖  
B. 对于入睡困难者,一般可使用短效抗失眠药物  
C. 对于睡眠维持障碍者,可使用中、长效抗失眠药物  
D. 超过 4 周的药物干预需要每个月定期评估
21. 胃黏膜的保护因素,不包括( )。
- A. 黏液屏障                                      B. 黏膜丰富的血流  
C. 胃泌素    D. 前列腺素
22. 对于慢性胃炎治疗的叙述,不正确的是( )。
- A. 根除 Hp    B. 使用 NSAID  
C. 保护胃黏膜                                      D. 抑制胆汁反流
23. 关于抗甲状腺药物叙述,不正确的是( )。
- A. 甲硫咪唑与丙硫氧嘧啶的作用机制基本相同  
B. 因治疗需要,抗甲状腺药物导致的皮疹加重可用抗组胺药物治疗,不能停药  
C. 甲硫咪唑导致的粒细胞减少和粒细胞缺乏多发生在用药后的 2~3 个月内  
D. 甲硫咪唑抗甲状腺作用较丙硫氧嘧啶约强 10 倍,且疗效快,持续作用时间长
24. 不属于促白细胞生成的药物是( )。
- A. 盐酸小檗胺                                      B. 维生素 B<sub>4</sub>  
C. 利可君    D. 维生素 K
25. 下列疾病通过多吃新鲜水果和蔬菜即可取得治疗效果的是( )。
- A. 缺铁性贫血                                      B. 再生障碍性贫血  
C. 维生素 B<sub>12</sub> 缺乏性贫血                      D. 叶酸缺乏性贫血

26. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是( )。
- A. 口服吸收缓慢  
B. 肝内代谢转化快  
C. 肾脏排泄速度快  
D. 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
27. 药疹治疗的首要措施是( )。
- A. 停用致敏药物  
B. 输液促进药物排泄  
C. 应用大剂量糖皮质激素  
D. 应用激素并同时用抗菌药物
28. IgA 肾病应评估肾脏疾病进展的风险,治疗上以降蛋白尿和降压为主,如尿蛋白 $>0.5\text{g/d}$ 时,推荐的药物治疗是( )。
- A. 小剂量激素  
B. ACEI 或 ARB  
C. 钙调磷酸酶抑制剂  
D. 烷化剂
29. 尿路感染最常见的细菌为( )。
- A. 黏质沙雷菌  
B. 大肠埃希菌  
C. 肠球菌  
D. 变形杆菌
30. 属于弱阿片药物的是( )。
- A. 可待因  
B. 吗啡  
C. 芬太尼  
D. 哌替啶
31. 不符合癌痛三阶梯止痛治疗方案用药原则的是( )。
- A. 按阶梯用药  
B. 疼痛时给药  
C. 个体化给药  
D. 口服给药
32. 属于长效 NSAID 的是( )。
- A. 对乙酰氨基酚  
B. 布洛芬  
C. 双氯芬酸  
D. 塞来昔布
33. 增加尿酸排泄的药物是( )。
- A. 别嘌醇  
B. 苯溴马隆  
C. 双氯芬酸  
D. 非布司他
34. 治疗类风湿关节炎的药物中,给药频率为每周 1 次的是( )。
- A. 环磷酰胺  
B. 氨甲蝶呤  
C. 硫唑嘌呤  
D. 环孢素

35. 关于骨质疏松,说法不正确的是( )。
- A. 随着世界人口老龄化,骨质疏松已成为威胁人类健康的常见疾病  
B. 骨质疏松分为原发性、继发性两大类  
C. 不同类型的骨质疏松,其治疗和预防的原则是相同的  
D. 治疗骨质疏松首先要去除病因
36. 双膦酸盐类的主要不良反应是( )。
- A. 上消化道紊乱和对食管的刺激  
B. 植物神经功能紊乱  
C. 头痛和眩晕  
D. 便秘和腹泻
37. 不属于急性化脓性中耳炎常见致病菌的是( )。
- A. 肺炎链球菌  
B. 乙型溶血性链球菌  
C. 葡萄球菌  
D. 大肠埃希菌
38. 过敏性结膜炎可选用( )。
- A. 四环素眼膏  
B. 0.1%碘苷滴眼液  
C. 普拉洛芬滴眼液  
D. 2%色甘酸钠滴眼液
39. 结膜炎的药物治疗方法中,不建议采用的是( )。
- A. 局部给药为主,严重结膜炎必要时全身给药  
B. 根据微生物种类进行药物选择  
C. 眼膏宜睡前使用,可发挥持续的治疗作用  
D. 长期联用多种抗菌药物滴眼液
40. 对细菌性阴道病的治疗,错误的是( )。
- A. 甲硝唑是首选药物  
B. 甲硝唑 2g,单次顿服  
C. 2%克林霉素膏 5g,阴道上药,每晚 1 次,共 7 天  
D. 克林霉素 300mg,每日 2 次,连服 7 日

二、配伍选择题(每一组有 2—4 题,共用四个备选项。备选项可重复选用,也可不选用。每题只有一个最佳答案。每题 2 分,共 20 分)

- A. 洛伐他汀  
B. 吉非贝齐  
C. 依折麦布  
D. 考来烯胺
41. 属于贝特类药物的是( )。
42. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是( )。
- A. 苯妥英钠  
B. 丙戊酸钠  
C. 卡马西平  
D. 氯硝西泮

43. 下列为全面强直阵挛发作的一线治疗药物的是( )。
44. 对精神运动性发作癫痫最有效( )。
- A. 消旋卡多曲                      B. 蒙脱石  
C. 盐酸小檗碱                      D. 地衣芽孢杆菌活菌
45. 止泻机制是收敛、吸附、保护黏膜( )。
46. 止泻机制是抑制肠道过度分泌( )。
- A. 苯海索                              B. 恩他卡朋  
C. 普拉克索                            D. 溴隐亭
47. 抗帕金森病的机制是大剂量可激动黑质-纹状体通路的  $D_2$  受体( )。
48. 抗帕金森病的机制是选择性激动  $D_3$  受体( )。
49. 抗帕金森病的机制是阻断中枢胆碱受体( )。
50. 抗帕金森病的机制是抑制外周的 COMT, 增加左旋多巴生物利用度( )。

试卷代号:11475

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

药物治疗学(本) 试题答案及评分标准

(供参考)

2024年7月

一、单项选择题(每题2分,共80分)

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D  | 2. B  | 3. B  | 4. D  | 5. D  |
| 6. D  | 7. C  | 8. D  | 9. C  | 10. D |
| 11. A | 12. D | 13. D | 14. B | 15. B |
| 16. A | 17. A | 18. C | 19. B | 20. C |
| 21. C | 22. B | 23. B | 24. D | 25. D |
| 26. D | 27. A | 28. B | 29. B | 30. A |
| 31. B | 32. D | 33. B | 34. B | 35. C |
| 36. A | 37. D | 38. D | 39. D | 40. B |

二、配伍选择题(每一组有2—4题,共用四个备选项。备选项可重复选用,也可不选用。每题只有一个最佳答案。每题2分,共20分)

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41. B | 42. A | 43. B | 44. C | 45. B |
| 46. A | 47. D | 48. C | 49. A | 50. B |