

试卷代号:23665

座位号

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

老年护理基本技能 试题

2024年7月

学 号: _____

姓 名: _____

考点名称: _____

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题2分,共60分)

1. 患者,男,65岁,糖尿病,因术后切口感染且高热,大量应用抗生素治疗。一日,护士小罗发现患者口腔存在真菌感染,为其进行口腔护理时,可选用的漱口液为()。
A. 0.02%呋喃西林溶液
B. 1%~4%碳酸氢钠溶液
C. 生理盐水
D. 朵贝尔氏液
E. 0.1%醋酸溶液
2. 患者,男,80岁,高血压30年,因近期血压控制不良而入院治疗,带有活动假牙。护士对其假牙的护理措施错误的是()。
A. 取下的假牙用冷水冲洗干净
B. 老人漱口后,协助将假牙戴回
C. 用牙膏彻底清洗假牙
D. 暂时不用的假牙可置于热水中浸泡
E. 协助老人戴假牙前,应先浸湿
3. 为高热老年人进行酒精擦浴时,禁擦的部位是()。
A. 侧颈、上肢
B. 腋窝、腹股沟
C. 前胸、腹部
D. 臀部、下肢
E. 背部、肘窝
4. 为老年人保暖解痉最简便的方法是()。
A. 热水袋
B. 热坐浴
C. 热湿敷
D. 温水浴
E. 红外线照射
5. 关于体温计的检查与校对方法中错误的是()。
A. 所有体温计的汞柱甩至35℃以下
B. 同时放入40℃温水中
C. 3分钟后取出检查
D. 读数相差0.5℃以上的体温计不能再使用
E. 汞柱有裂隙的体温计不能再使用
6. 患者,女,76岁,高血压病,为其测量血压时正确的做法是()。
A. 若采取立位测量,手臂应平第六肋间
B. 放气时听到的最强音即为收缩压
C. 缓慢放气,速度4mmHg/s
D. 听到变音即为舒张压
E. 听到舒张压后保持放气速度,直到汞柱回到零位

7. 利用平车运送老年人时,老人头部卧于大轮端的原因是()。
- A. 大轮灵活、易转动 B. 大轮平稳,使老人舒适
C. 大轮转动时震动大 D. 大轮直径长,易滑动
E. 大轮摩擦小,较稳定
8. 两人搬运老人的方法正确的是()。
- A. 甲托背部,乙托臀、膝部 B. 甲托头、肩部,乙托臀部
C. 甲托颈、腰部,乙托小腿和大腿 D. 甲托头、背部,乙托臀和小腿
E. 甲托颈、肩、腰部,乙托臀、腘窝处
9. 采用物理或化学方法清除或杀灭除芽孢以外的病原微生物,称为()。
- A. 消毒 B. 灭菌
C. 无菌 D. 清洁
E. 抑菌
10. 热力消毒灭菌法的原理是()。
- A. 干扰细菌酶的活性 B. 破坏细菌膜的结构
C. 使菌体蛋白发生光解变性 D. 使菌体蛋白及酶变性凝固
E. 抑制细菌代谢和生长
11. 关于无菌物品,下列说法错误的是()。
- A. 无菌物品不可在空气中暴露时间过长
B. 一份无菌物品只能供一位老人使用
C. 无菌物品与非无菌物品需分开存放
D. 无菌物品应定期检查有效使用期
E. 无菌物品取出未用,在未被污染的情况下可再放回无菌容器内
12. 铺好的无菌盘,有效期为()。
- A. 24 小时 B. 8 小时
C. 4 小时 D. 1~2 周
E. 夏秋季 4 小时,冬春季 12 小时
13. 传染病房的护士小李,正在穿隔离衣进入病房,她在穿隔离衣的时候要注意避免污染()。
- A. 衣领 B. 胸前
C. 背部 D. 袖子的后面
E. 腰带以下的部分

14. 在超声波雾化器工作原理中,将电能转换为超声波声能的装置是()。
- A. 超声波发生器 B. 雾化罐透声膜
C. 雾化罐过滤器 D. 晶体换能器
E. 电子管
15. 因慢性心功能不全服用洋地黄类药物患者,应重点观察()。
- A. 胃肠道反应 B. 心率
C. 是否成瘾 D. 尿液的性状
E. 有无皮疹
16. 取药过程中,下列操作不正确的一项是()。
- A. 胶囊须用药匙取用
B. 药液不足 1ml 时须用滴管计量
C. 油剂用量杯计量后可直接倒入药杯
D. 同时用几种药液,应分别放置
E. 先配固体药,再配液体药
17. 关于正确服药方法的描述,下列不正确的是()。
- A. 健胃药应饭前服
B. 服用安眠药应防止成瘾
C. 服退热药后应多喝水
D. 缓释片、胶囊吞服时可嚼碎
E. 磺胺类药物应准时服用,以保证有效的血药浓度
18. 自安瓿内抽吸药液,下列操作不正确的是()。
- A. 将安瓿尖端药液弹至体部 B. 用 75%酒精消毒安瓿颈部及砂轮
C. 针尖斜面向下放入安瓿内的液面下 D. 手握活塞,进行吸取药液
E. 乳头朝上,轻推活塞,排出空气
19. 在执行给药原则中,最重要的一项是()。
- A. 遵医嘱给药 B. 给药途径要准确
C. 给药时间要准确 D. 注意用药不良反应
E. 给药后要注意观察疗效
20. 测量胃管插入长度的方法正确的是()。
- A. 从眉心至胸骨柄 B. 从前发际至剑突
C. 从眉心至剑突 D. 从前发际至胸骨柄
E. 从鼻尖至剑突

21. 为昏迷患者插胃管前应采取的措施是()。
- A. 将患者的头后仰 B. 使患者的头贴近胸骨
C. 为患者取仰卧位,头偏向一侧 D. 将患者扶至半坐卧位
E. 将患者的头托起
22. 若氧流量表显示氧流量是 2L/min,此时氧浓度为()。
- A. 19% B. 29%
C. 39% D. 49%
E. 59%
23. 关于用氧方法的描述,下列正确的是()。
- A. 停用氧时,先拔出鼻导管再关闭氧气 B. 氧气表及螺旋口上应涂油润滑
C. 用氧时,先插入鼻导管再调节氧流量 D. 氧气筒应至少距火炉 1m、暖气 5m
E. 持续用氧者,每周更换鼻导管 2 次
24. 进行结肠造口灌洗的适宜时间是()。
- A. 睡前 B. 餐前
C. 餐后 D. 两餐之间
E. 晨起空腹时
25. 长期卧床老人预防其压力性损伤发生最有效的护理措施是()。
- A. 受压部位勤按摩
B. 加强营养
C. 保持皮肤清洁、干燥
D. 及时更换受污的被服、床单
E. 协助经常更换卧位,防止局部组织长期受压
26. 某老人头颈部被烫伤,其烧伤面积为()。
- A. 3% B. 6%
C. 9% D. 12%
E. 15%
27. 对于呼吸道有异物阻塞且意识不清的瘦小老年伤者,应立即采取()。
- A. 他人互救胸部冲击 B. 他人互救腹部冲击
C. 自救胸部冲击 D. 自救腹部冲击
E. 自救胸腹部冲击

28. 成人心肺复苏中按压与通气的比率为()。
- A. 30 : 2 B. 30 : 1
C. 35 : 2 D. 35 : 1
E. 15 : 2
29. 心脏按压时,按压部位及抢救者双手的摆放是()。
- A. 胸骨中、下 1/3 交界处,双手平行叠放
B. 胸骨中、下 1/3 交界处,双手垂直叠放
C. 胸骨左缘两横指,双手平行叠放
D. 胸骨左缘两横指,双手垂直叠放
E. 心前区,双手垂直叠放
30. 下列属于深 II° 烧伤的是()。
- A. 局部红、肿、热、痛,有红斑 B. 局部出现水泡,剧痛
C. 局部无水泡,痛觉迟钝 D. 局部为焦黄色,无水泡
E. 局部无水泡,痛觉消失

二、简答题(四题选二题,多答不给分,每题 20 分,共 40 分)

31. 简述轮椅运送法的注意事项。
32. 简述卫生手消毒的适用范围。
33. 简述皮下注射的概念、常用部位的选择原则、常用部位;及皮下注射操作时的注意事项。
34. 列出判断心跳、呼吸骤停的主要依据。

试卷代号:23665

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

老年护理基本技能 试题答案及评分标准

(供参考)

2024年7月

一、单项选择题(每题2分,共60分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. C | 4. A | 5. D |
| 6. C | 7. B | 8. E | 9. A | 10. D |
| 11. E | 12. C | 13. A | 14. D | 15. B |
| 16. C | 17. D | 18. D | 19. A | 20. B |
| 21. A | 22. B | 23. A | 24. C | 25. E |
| 26. C | 27. B | 28. A | 29. A | 30. C |

二、简答题(四题选二题,多答不给分,每题20分,共40分)

31. 简述轮椅运送法的注意事项。

答:(1)上下轮椅时,必须锁住轮椅的车闸,抬起脚踏板,撤下架腿布,错误地站在脚踏板上,有跌倒的危险。

(2)换乘轮椅时,放下脚踏板,然后把脚放在恰当的位置上,脚踏板遗忘时,可用绳子等物固定。

(3)照顾者的脚前后或左右打开,这样基底面扩大,站得稳,可以全力地进行操作。在上下台阶或路不平时,小车轮应向上抬起,并及时告诉老年人,并让老年人手抓住扶手,后背靠住轮椅的靠背。看不清前面路况时,不应贸然前行,否则有可能产生危险。

(4)与老年人聊天等交流方式,给予其心理上的照料。

(每项5分,共20分)

32. 简述卫生手消毒的适用范围。

答:(1)直接接触每个患者前后,从同一患者身体的污染部位移动到清洁部位时。(4分)

(2)接触患者黏膜、破损皮肤或伤口前后,接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料等之后。(4分)

(3)穿脱隔离衣前后,摘手套后。(3分)

(4)进行无菌操作、接触清洁、无菌物品前。(3分)

(23665号)老年护理基本技能答案第1页(共2页)

(5)接触患者周围环境及物品后。(3分)

(6)处理药物或配餐前。(3分)

33. 简述皮下注射的概念、常用部位的选择原则、常用部位;及皮下注射操作时的注意事项。

答:(1)概念:皮下注射是将少量药液注入皮下组织内的方法(2分)

(2)选择原则:皮下注射应选择血管、神经分布少,组织松弛状态良好、无骨突隆,易于注射的部位(3分)

(3)常用部位:上臂外侧,大腿前侧、外侧,下腹部组织及后背肩胛下方(3分)

(4)皮下注射操作时注意事项:

1)严格遵守无菌技术操作原则:①注射前必须洗手,戴口罩,保证注射环境清洁,半小时内无清扫等活动。②按照无菌原则取用无菌注射器,注射器的活塞、针筒内壁、乳头部、针尖与针梗必须保持无菌。③严格按规程消毒注射部位皮肤,并保持无菌。(每项2分,共6分)

2)需要长期皮下注射的患者,应经常变换注射部位,以保护局部组织,同时有利于药物吸收。(2分)

3)进针不宜过深,角度不宜过大,以免刺入肌层;对过于消瘦者,可捏起局部组织,适当减小穿刺角度。(2分)

4)进针后,推注药液前,应先抽动注射器活塞,检查有无回血。如有回血,则应拔出针头,更换部位,再行消毒、注射。(1分)

5)注射时做到“二快一慢”,即进针快、拔针快、推药慢。(1分)

34. 列出判断心跳、呼吸骤停的主要依据。

答:(1)意识丧失或伴抽搐;(3分)

(2)颈动脉、股动脉等大动脉搏动消失;(3分)

(3)呼吸停止;(3分)

(4)瞳孔散大;(3分)

(5)皮肤苍白或发绀;(3分)

(6)心尖搏动及心音消失;(3分)

(7)伤口不出血。(2分)

(23665号)老年护理基本技能答案第2页(共2页)